



# 化学療法(CHOP療法)入院計画表

様

主治医

担当看護師

退院基準: \*日常生活に支障を来たす嘔気・嘔吐がない \*血尿がない \*今後の治療計画について説明をうけている

	入院日( / / )	入院2日目・CHOP療法日( / / )	入院3日目・退院日( / / )
検査 治療 処置	血液検査と尿検査があります。 	医師が点滴用の管を入れ、治療開始となります。 赤い点滴前から終了後30分まで口内炎を予防するために氷をお渡ししますので口の中に入れてなめて下さい。(溶けた氷は専用の容器に出して下さい) 治療終了後、点滴の管を抜きます。	医師の診察後、退院となります。
薬剤	普段服用している薬は引き続きお飲み下さい。	プレドニンの内服が始まります。(5日間) 大切な薬です。忘れずにお飲み下さい。	→
安静度	病院内歩行	点滴中はトイレ以外はできるだけ安静にして下さい。	病院内歩行
排泄	制限はありません。	午前8時から翌日の午前8時まで尿量を測定します。	午前8時で尿量測定は中止です。
清潔	シャワー	治療終了後よりシャワーは可能です。	シャワー
食事 栄養管理	特に制限はありません。	吐き気がある時や食欲がない時は、食事内容を変更しますのでお知らせください。	特に制限はありません。
説明 指導 教育	病棟の案内をします。 医師より治療についての説明があります。 薬剤師より薬の説明があります。 看護師より蓄尿の説明があります。 	水分はいつもより多めに飲んで下さい。 点滴の入っている部位の痛み・腫れ・赤みなどが出現したらすぐにお知らせ下さい。 点滴終了後、いつもより赤い尿がでる場合は看護師にお知らせください。	プレドニンは忘れずにお飲み下さい。 便秘になりやすいので、便秘時は水分や食物繊維を多くとりましょう。 感染防止のため、人ごみは避けて下さい。 外出後は、手洗い・うがいに心掛けて下さい。 赤い尿がでる場合は外来にお越しください。  次回受診は 月 日 