医療用麻薬を導入される患者様へ

様

治療の目標	（当日～14日目）副作用なく内服できる （当日～2日目） 痛みがなく、夜眠れる　　（～3日目） 静かにしていれば痛くない　　（4～5日目）歩いたり体を動かしたりしても痛くない

	導入当日	導入2日～13日目	導入14日目
検査	□レントゲンと血液検査があります。		
薬剤	□オキシコンチン5mg1回1錠　1日2回 （　　）時（　　）時 □ノバミンを1回1錠　1日3回 □マグミット330mgを1回1錠　1日3回 飲んでいただきます。 □（　　）と（　　）は継続します。 □オキノーム2.5mgは1時間空ければ1日何回でも服用可能です。	□オキシコンチン開始3日から痛みに合わせて増量を検討します。 □便秘があれば、ピコスルファートナトリウムを飲んでいただきます。 	□吐き気がなければノバミンを中止します。
排泄	□排便の回数・形を教えてください。	□排便の回数・形を教えてください。	□排便の回数・形を教えてください。
説明	□「痛みの治療をはじめられる患者さまへ」のパンフレットを用いて説明をします。 □「痛み日記」に沿って、痛みの強さ、吐き気、眠気、睡眠の状態、排便状態を記入してください。	□辛い症状があれば、原因と対処の方法を説明します。	□辛い症状があれば、原因と対処の方法を説明します。

京都桂病院　緩和ケアチーム　2015.12.3 Ver.1