末梢性T細胞リンパ腫[PTCL]

フォロデシン内服療法

		Day	1	2	3	•••	•••	•••
ムンデシン	600mg 分2	内服	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	^		\rightarrow
			連E	3内肌	₹	適国	主減量	

プララトレキサート療法

		Day	1	•••	8	 15	•••	22	•••	29	•••	36	•••	43	•••
ジフォルタ	$30 \text{mg} / \text{m}^2$	点滴静注	\downarrow		\downarrow	\downarrow		\downarrow		\downarrow		\downarrow		休	

6週連続で投与し、7週目は休薬

ロミデプシン注療法

		Day	1		8	•••	15	•••	22	•••	28
イストダックス	$14 \text{mg} / \text{m}^2$	点滴静注	\downarrow		\downarrow		\downarrow				
			1 🗆	ース	28	日間					

THP-COP-E 療法

			Day	1	2	3	4	5	•••	•••	21	
THP-ADM	テラルビシン	$50 \text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	\downarrow								
CPA	エンドキサン	$750 \text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	↓								
VCR	オンコビン	$1.4 \text{mg} / \text{m}^2$	静注	↓								最大2mg
VP-16	エトポシド	$60 \text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	↓	\downarrow	↓						
PSL	プレドニン	100mg /⊟	内服	↓	\downarrow	↓	↓	→				
				21	⊟(3	週) 1	1 □ -	-ス				

A+CHP療法

			Day	1	2	3	4	5	 21	
	アドセトリス	1.8mg /kg	点滴静注	\downarrow						
CPA	エンドキサン	$750 \text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	\downarrow						
DXR	ドキソルビシン	50mg /m ²	点滴静注	\downarrow						
PSL	プレドニゾロン	100mg/body	内服	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow		
	1		<u> </u>						 	

21日(3週)1コース 全8コース

CPT-11(2W2R)

			Day	1	2	თ	• • • •	8	9	10	•••	28
CPT-11	イリノテカン	$40 \text{mg} / \text{m}^2$	点滴静注	\downarrow	\rightarrow	↓		\downarrow	\downarrow	\downarrow		
				1 🗆	ース	.28	日間					

CPT-11(3W2R)

			Day	1	2	Э		8	0	10	 15	16	17	 35
CPT-11	イリノテカン	$40 \text{mg} / \text{m}^2$	点滴静注	\downarrow	\rightarrow	↓		\downarrow	\downarrow	↓	↓	\downarrow	\rightarrow	
				17	ース	356	日間							

バレメトスタ	'ット療法		Day	1	2	3	• • •
	エザルミア錠	200mg分1 空腹時	内服	\rightarrow	^		\rightarrow
				連E	内肌	2	